


# SIGNOS DE ALERTA PARA DETECTAR PÉRDIDAS AUDITIVAS A LO LARGO DE LA EDAD PEDIÁTRICA



No todas las sorderas infantiles se detectan al nacer. Pueden presentarse a lo largo del desarrollo como sordera progresiva y de desarrollo tardío o como sorderas adquiridas.

Por ello, es necesario vigilar en el seguimiento pediátrico, en el entorno familiar y en el ámbito educativo, algunos signos de alerta que ayudan a detectar pérdidas auditivas, que pueden pasar desapercibidas.





# ENTRE LOS 6 MESES DE VIDA Y LOS 15 AÑOS, HAY QUE OBSERVAR SI...

## ANTES DE LOS DOS AÑOS



- ✓ No se asusta, ni altera con ruidos fuertes y repentinos
- ✓ No responde con sonidos vocálicos cuando se le habla
- ✓ No se orienta ni gira la cabeza ante voces o sonidos familiares
  - ✓ No juega con vocalizaciones, ni imita sonidos
  - ✓ No hace sonar juguetes u objetos a su alcance
    - ✓ No reacciona a su nombre
    - ✓ No presta atención a los cuentos
- ✓ No atiende a las canciones infantiles, ni juega imitando los gestos que las acompañan
  - ✓ No dice papá/mamá
- ✓ No señala objetos ni a personas familiares cuando se le nombran
- ✓ No entiende instrucciones sencillas como “dame...”, “toma...”, “ven...” “di adiós...”

## ENTRE LOS DOS Y LOS CUATRO AÑOS



- ✓ No atiende a lo que se le dice si no está mirando a quien le habla
  - ✓ No nombra algunos objetos familiares
  - ✓ No hace frases de dos palabras
- ✓ No progresa en las habilidades de habla y comunicación
  - ✓ No identifica de dónde provienen los sonidos
    - ✓ Se frustra fácilmente
  - ✓ Pregunta frecuentemente “¿Qué?”, “¿Eh?”...

## A PARTIR DE LOS CUATRO AÑOS

- ✓ Muestra hipersensibilidad a ciertos sonidos
- ✓ Para la escucha y/o acercarse a una fuente de sonido, recurre preferentemente a uno de sus oídos
  - ✓ No conversa con otros niños
  - ✓ Solo su familia entiende lo que dice
- ✓ Manifiesta problemas de conducta o dificultades sociales
- ✓ Presenta retraso del aprendizaje y cambios en su rendimiento escolar
- ✓ Manifiesta alteraciones en el lenguaje, hablado y/o escrito, que denotan una mala discriminación del habla
  - ✓ Refiere que oye la voz y otros sonidos de forma atenuada
    - ✓ Evidencia dificultad para oír sonidos agudos
  - ✓ Entiende mal las conversaciones en lugares ruidosos
  - ✓ Tiene problemas para entender conversaciones por teléfono
    - ✓ Hace repetir frecuentemente lo que se le dice
  - ✓ Pide a los demás que hablen más despacio, claro y/o alto
- ✓ Sube el volumen de la televisión y de cualquier otro dispositivo electrónico
  - ✓ Se queja de percibir zumbidos en los oídos



consulta con el médico

